

# حقن البوتولينوم توكسين (البوتوكس) لعلاج الحول

Botulinum Toxin (Botox)

خبرة عالمية  
في  
عناية  
العيون

مستشفى  
مورفيلدز  
دبي للعيون  
فرع من مورفيلدز لندن



King's

مستشفى كينغز كوليدج لندن  
King's College Hospital London

## 1. ما هو تأثير البوتولينوم توكسين (البوتوكس)؟

يسبب البوتولينوم توكسين (البوتوكس) شللاً في العضلة التي يحقن فيها.

## 2. منذ متى يستخدم؟

يستخدم للعلاج لدى مستشفى مورفيلدز منذ عام 1982.

## 3. هل سيؤثر استعماله على صحتي عموماً؟

العلاج آمن تماماً ولا توجد أية مخاطر على الصحة. وبشكل خاص، نؤكد أنه لا يوجد خطر من حدوث التسمم الغذائي أو غيره من أنواع التسمم، كما لا يوجد خطر في استخدام العلاج على السيدات الحوامل والمرضعات، إلا أن بعض المريضات تفضلن تأجيل العلاج إلى وقت لاحق في تلك الحالة.

## 4. من سأقابل عند الحضور إلى العيادة؟

سيقوم بفحصك أولاً فاحص النظر ومن ثم الطبيب الذي سيناقش معك الخيارات العلاجية المتاحة. إذا كنت تحتاج للعلاج وتود المضي قدماً في الأمر، فسيطلب منك قراءة وتوقيع نموذج الموافقة. يتم عادة علاج المرضى في نفس اليوم، ويمكن أن تتوقع البقاء في العيادة لفترة تصل إلى 3 ساعات.

## 5. ما هي إجراءات العلاج؟

سيتم إعطاؤك قطرات تخدير موضعي لتخدير العين، وهي فعالة جداً في التخلص من الألم في سطح العين ولكن يجب أن تلاحظ أنك ستشعر ببعض الانزعاج عند الحقن (خاصة إن كانت هناك أنسجة مصابة حول العضلة بسبب عملية سابقة). بعدها سيتم توصيل بعض الأسلاك بجبهتك، ترتبط من الجهة الأخرى بمضخم صوت وسماعة مما يسمح بالحقن الدقيق في العضلة من خلال متابعة النشاط الكهربائي فيها. ستسمع ذلك خلال الحقن عبر السماعة. وفي بعض الأحيان قد نقوم بحقن أكثر من عضلة واحدة.

## 6. ماذا يحدث بعد الحقن؟

ستسأل إن كنت تفضل وضع قطعة قماش على العين أو ارتداء نظاراتك. ستكون العين مخدرة بعد القطرات ولهذا لا بد من حمايتها لمدة ساعتين بعد الحقن لكي لا يدخل إليها شيء دون معرفتك. قد تشعر بالألم في العين بعد الحقن، وإن لم يزل هذا الشعور بعد ساعة، فتناول أي مسكن تتناوله عادة عند الشعور بالصداع.

## 7. متى يتوقع أن ألاحظ أثر العلاج؟

عادة يمكن للمريض ملاحظة أثر العلاج بعد يومين من الحقن.

## 8. كم من الوقت يدوم تأثير العلاج؟

يتباين الوقت حسب الحالة ولكنه عادة يدوم لأسابيع وربما أشهر قبل أن ينقضي. بداية قد تلاحظ تغيراً مؤقتاً في اتجاه الحول ومن ثم استقامة تدريجية في العيون مع انتهاء مفعول الحقنة.

## 9. ما هي الآثار الجانبية المحتملة

◀ تغير مؤقت في اتجاه الحول .

◀ الرؤية المزدوجة لفترة مؤقتة. يجب أن لا تقود مركبة إذا عانيت من الرؤية المزدوجة، ومن المهم للغاية أن تناقش الأمر مع طبيبك قبل العلاج إذا كان الأمر يشكل أهمية كبيرة لك.

◀ ارتخاء مؤقت في الجفن من جهة الحقن، ويختفي ذلك عادة بعد بضعة أسابيع.

◀ كدمة خفيفة على سطح العين.

وتزول كل تلك الآثار دون علاج.

## 10. متى يجب أن أعود إلى العيادة ؟

بعد أسبوع أو أسبوعين من الحقن. في حال لم يكن تأثير الحقنة الأولى كافياً، فإننا قد نعرض عليك تكرار العملية في تلك الزيارة.

إذا كانت لديك أي استفسارات عن هذه العملية وإجراءاتها، نرجو أن تطلب من الطبيب المعالج توضيحها قبل توقيع نموذج الموافقة.

مورفيلدز دبي

مستشفى  
مورفيلدز  
دبي للعيون  
فروع من مورفيلدز لندن



مستشفى مورفيلدز دبي للعيون

مدينة دبي الطبية،

ص.ب 505054، منطقة 1،

بناية الرازي 64، مبنى هـ، الطابق 3،

دبي، أ.ع.م.

هاتف +971 4 429 7888

moorfields.ae

**ساعات العمل:**

السبت إلى الخميس، 8.30 صباحاً إلى 5.30 مساءً،

للمعلومات والنصائح حول أمراض العيون وعلاجها من قبل

كادر مختص ومؤهل.

King's

مستشفى كينغز كوليدج لندن  
King's College Hospital London

مستشفى كينغز كوليدج - دبي هيلز

دبي هيلز، شارع الخيل، مخرج المربع شرق

هاتف: +9714 247 7777

مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

